

De nationale vereniging voor fibromyalgie-patiënten (F.E.S.) heeft via een vragenlijst op social media en de website aan mensen met fibromyalgie gevraagd wat hun ervaringen zijn met eventuele bijwerkingen van vaccinatie. De eerste 1000 resultaten zijn inmiddels binnen. In deze sheet is overzichtelijk gemaakt wat de reacties van respondenten zijn op het **Moderna-vaccin**.

COVID-19 bijwerkingen van vaccinatie bij mensen met fibromyalgie




Moderna

10 augustus 2021



Van het totale aantal van bijna 1000 respondenten geeft 8% van de mensen met fibromyalgie aan te zijn gevaccineerd met Moderna.

De eerste prik met het Moderna-vaccin zorgde voor:



Van de respondenten met het Moderna-vaccin heeft 56% een tweede vaccinatie gehad.

De tweede prik met het Moderna-vaccin zorgde voor:




De bijwerkingen van de eerste prik met het Moderna-vaccin duurden:



De bijwerkingen van de tweede prik met het Moderna-vaccin duurden:



Over het algemeen worden de bijwerkingen van het eerste vaccin met Moderna omschreven als:



Over het algemeen worden de bijwerkingen van het tweede vaccin met Moderna omschreven als:

